# 下腿潰瘍中醫治療

# 邱定醫師 保安堂中醫診所院長

#### 前言:

下腿潰瘍中醫名臁瘡是指發生在小腿的慢性潰瘍,俗稱溶爛疔,小腿潰瘍是現代醫學病名。

臁瘡之名首見於唐<華陀神醫秘傳>

明<瘍醫準繩臁瘡>說:因溼熱下注,淤血凝滯於經絡,以致肌肉紫黑疼痛不時 清<瘍科心得集卷中>載有:臁瘡者生於兩臁,初起發腫,久而腐爛或浸濕瘙癢, 破而膿水淋漓,乃風熱濕毒相聚而成,或因飲食起居,虧損肝腎陰火下流,外邪 相搏所致。

外臁屬三陽經 \*\*易治

內臁屬三陰經 \*\*難治

故其病機總由脾胃溼熱下注,中氣下陷,局部瘀血滯留所致

#### 下腿潰瘍特點:

- 1. 好發於小腿下三分之一處
- 2. 易發生下肢靜脈曲張
- 3. 瘡口凹陷邊緣壟起
- 4. 瘡面肉色灰暗
- 5. 流溢稀薄膿水
- 6. 瘡口周圍皮膚色素沉著
- 7. 傷口經久難斂且易復發 此病歷代醫家論述頗多,被視爲瘡家頑症。好發於中老年男性,以從事體力

勞動者爲多,有患一側,有兩側俱患,但傷筋損骨者並不多見。

#### 病因病機

內因: 多由肝氣鬱結,脾虛下陷,腎經虧損,濕濁下注,凝滯小腿經脈,氣血凝結,而爲臁瘡。

外因: 多由負擔過重,久立遠行勞傷筋脈,筋脈血瘀,或皮膚濕癢,或創傷治療 失當,或昆蟲咬傷皮破肉腐而爲臁瘡。

#### 證候與治療

一. 初期病程較短,限於數日之內,多爲淺表小潰瘍,膿水稀薄,肉芽不鮮,潰口不斂,傷口周圍皮膚紫滯暗紅微硬,外周小腿常有腫脹,朝輕暮重,活動後尤甚,或傷口周圍皮膚糜爛,癢痛兼作。

證: 為溼熱交阻凝滯經脈

治:宜清熱利濕當歸拈痛湯+萆瀉+通草+金銀花

二. 若日久不癒, 潰口逐漸加深加大, 傷口有深有淺, 凹陷邊緣如岸, 肉芽暗沉, 上覆灰黃薄膜樣物(不可清除), 分泌物污穢, 臭穢不堪, 微癢微痛, 或 青筋暴露, 或小 腿腫, 按之綿軟。

證:氣虛血瘀夾濕

治:四君子湯+金銀花+皂刺+黃耆

三. 若患病多年,潰瘍光滑板亮,蒼白無肉芽,膿水稀少,潰口周圍或整個小腿 肌肉萎縮,頑硬貼骨,皮色灰黑,微癢不痛。

證:氣血兩虛肌膚失於榮養

治:補中益氣湯+十全大補湯+黃耆

# 外治法----爲本病治療重點中的重點

1.清潔瘡口不可用會影響生肌的雙氧水。

 2.瘡口周圍最怕皮膚濕疹發炎,表皮糜爛,不但會 讓瘡口癢痛,更影響患者繼續治療的信心。

3. 瘡口切忌用收斂性的外用藥,收斂藥會使傷口變的乾硬結痂,肉芽將長不起來。

- 4.此病病因論述甚多,簡言之,就是下肢靜脈血管, 靜脈瘤性靜脈的進行,影響局部血液循環,所以, 改善下肢靜脈循環,爲第一要務。
- 5.要善用彈性繃帶,彈性繃帶很好用,可幫助。

#### 彈性繃帶使用需注意

- 1.彈性繃帶要整天縛綁。
- 2.從膝蓋以下都要整天打著,除非平臥休息或在睡覺,總之離開床鋪一定要打綁 腿,不可偷懶。
- 3.務必要求患者每天來換藥,順便可觀察患者配合度,配合不好的醫師一定要罵他(此乃爲他好)。

### 外敷注意事項

- 1. 瘡口用簡單的黃柏+甘草調凡士林外敷
- 2.紗布一定要塗很厚的凡士林,以免瘡口乾掉,一定要告知患者,瘡口要濕濕的, 要會流膿水,才不會金包銀。
- 3.若瘡口周圍濕疹可撒蜜陀僧粉劑 (此點很傷腦筋) (蜜陀僧 6 克+爐甘石 3 克+梅片 1.5 克)
- 4.用麻油調成膏狀,外敷糜爛的皮膚(藥粉 要固定好,不要跑進瘡口,以免影響內芽的生成。清洗瘡口 消毒瘡口最好是用 3%硼酸水消毒,不破壞組織,保護內芽生長,有生肌殺菌之雙重功效。

# 使用頻譜治療儀

- 1.對傷口局部之新陳代謝很有幫助。
- 2.下腿潰瘍症治,使用頻譜儀,太浪費時間,所以我並沒有使用,但有很多報告都持正面看法。